

Total No. of Printed Pages—8

**1 SEM FYUGP MTHC1**

**2 0 2 4**

( December )

MATHEMATICS

( Core )

Paper : MTHC1

( Calculus and Classical Algebra )

*Full Marks : 60 (80 for 2023 Batch)*

*Time : 2 hours (3 hours for 2023 Batch)*

*The figures in the margin indicate full marks  
for the questions*

1. (a) দেখুওৱা যে (Show that)

$$\frac{(1+i)^6(1-i\sqrt{3})^4}{(1-i)^8(1+i\sqrt{3})^5} = \frac{i}{4}$$

4

অথবা / Or

যদি (If)

$$x_r = \cos \frac{\pi}{3^r} + i \sin \frac{\pi}{3^r}; \quad r \geq 0$$

( 2 )

তেন্তে দেখুওৱা যে (then show that)

$$(i) \quad x_1 x_2 x_3 \dots = i$$

$$(ii) \quad x_0 x_1 x_2 \dots = -i$$

(b) যদি (If)

$$x + \frac{1}{x} = 2 \cos \theta; \quad y + \frac{1}{y} = 2 \cos \phi$$

তেন্তে দেখুওৱা যে,  $x^m y^n + \frac{1}{x^m y^n}$  বি কোনো এটা

মান  $2 \cos(m\theta + n\phi)$ . 4

then show that one of the values of

$$x^m y^n + \frac{1}{x^m y^n}$$
 is  $2 \cos(m\theta + n\phi)$ .

অথবা / Or

দেখুওৱা যে 1 অৰ  $n$  তম মূলবোৰে এটা গুণোত্তৰ  
প্ৰগতি গঠন কৰে।

Show that  $n$ th roots of unity form a  
geometric progression.

(c) দেখুওৱা যে (Show that)

$$\cos 6\theta = 32 \cos^6 \theta - 48 \cos^4 \theta + 18 \cos^2 \theta - 1$$

4

অথবা / Or

ডি ম'ইভাৰৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰা :

Solve using De Moivre's theorem :

$$x^8 + x^5 - x^3 - 1 = 0$$

( 3 )

2. (a) লিবনিজৰ সূত্ৰটো মূলতে কি কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়,  
লিখা।

1

Write the basic application of Leibnitz theorem.

- (b) যদি (If)

$$f'(x) = (x-a)^{2n} (x-b)^{2m+1}; \quad m, n \in \mathbb{N}$$

তেন্তে প্ৰথম অৱকলজ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা দেখুওৱা যে

then show using first derivative test that

(i)  $x = b$  এটা সৰ্বনিম্ন হয়; (is a minimum;)

(ii)  $x = a$  সৰোচ/সৰ্বনিম্ন নহয়। (is neither a maximum nor a minimum.)

3

- (c) যদি (If)

$$y^{\frac{1}{m}} + \frac{1}{y^{\frac{1}{m}}} = 2x$$

তেন্তে দেখুওৱা যে (the show that)

$$(x^2 - 1)y_{n+2} + (2n+1)xy_{n+1} + (n^2 - m^2)y_n = 0$$

4

- (d) ল'পিটেলৰ নিয়ম প্ৰয়োগ কৰি তলৰ ধি কোনো এটা  
প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা :

4

Using L'Hospital's rule, answer any one  
question of the following :

- (i) মান নিৰ্ণয় কৰা (Evaluate) :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2\log(1+x)}{x \sin x}$$

( 4 )

(ii) যদি (If)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 + a \cos x) - b \sin x}{x^3} = 1$$

তেন্তে  $a$  আৰু  $b$ ৰ মান উলিওৱা।

then find the values of  $a$  and  $b$ .

3. (a) যদি (If)

$$J_{m, n} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x dx;$$

$$m, n \in \mathbb{N}, m, n > 1$$

তেন্তে দেখুওৱা যে (then show that)

$$J_{m, n} = \frac{n-1}{m+n} J_{m, n-2} = \frac{m-1}{m+n} J_{m-2, n} \quad 4$$

(b)  $r = a(1 + \cos \theta)$  বক্রডালৰ সম্পূর্ণ দীঘ উলিওৱা আৰু  
দেখুওৱা যে ওপৰৰ অর্ধচাপটো  $\theta = \frac{\pi}{3}$  ত দ্বিখণ্ডিত হৈছে। 4

Find the perimeter of the curve  
 $r = a(1 + \cos \theta)$  and show that the upper  
half is bisected at  $\theta = \frac{\pi}{3}$ .

অথবা / Or

$x = 1$  ৰ পৰা  $x = 2$  লৈ, তলৰ বক্রডালৰ সম্পূর্ণ দীঘ  
উলিওৱা :

Find the length of the following curve  
from  $x = 1$  to  $x = 2$  :

$$y = \log \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

( 5 )

- (c) তলৰ বক্রডালৰ প্ৰাথমিক অক্ষ সাপেক্ষে হোৱা আৰ্বতনৰ ফলত উৎপত্তি হোৱা গোটা বস্তুটোৰ আয়তন আৰু  
পৃষ্ঠাগৰ কালি উলিওৱা :

4

Find the volume and surface area of  
the solid generated by revolving the  
following curve about the initial line :

$$r = a(1 - \cos\theta)$$

4. (a) খালী ঠাই পূৰণ কৰা :

1

যদি  $f$  আৰু  $g$  দুটা ফলন হয়, তেন্তে  $g \circ f$  সংজ্ঞাবদ্ধ  
হ'ব যদিহে \_\_\_\_\_।

Fill in the blank :

If  $f$  and  $g$  be any two mappings, then  
 $g \circ f$  will be defined only when \_\_\_\_\_.

- (b) দেখুওৱা যে যদি  $f: X \rightarrow Y$  এটা এক-একিকী ফলন  
হয়, তেন্তে এটা ফলন  $g: Y \rightarrow X$  থাকিব যাতে  $g \circ f$   
আৰু  $f \circ g$  যথাক্রমে  $X$  আৰু  $Y$  ত আইডেন্টিটি ফলন  
হ'ব।

3

Show that if  $f: X \rightarrow Y$  is a bijection,  
then there exists a mapping  $g: Y \rightarrow X$   
such that both  $g \circ f$  and  $f \circ g$  are  
identity mappings on  $X$  and  $Y$   
respectively.

- (c) দেখুওৱা যে যদি  $a$  এটা অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা হয়, তেন্তে  
Show that if  $a$  is an odd integer, then

$$a^{2^n} \equiv 1 \pmod{2^{n+2}}; \quad n \geq 1$$

4

## ( 6 )

(d) তলৰ বিবৃতি দুটা সাব্যস্ত কৰা : 2+2

Establish the following two statements :

$$(i) \text{ g.c.d. } (a, b) = d \Rightarrow \text{g.c.d.} \left( \frac{a}{d}, \frac{b}{d} \right) = 1$$

(ii) যদি  $a | bc$  আৰু  $\text{g.c.d. } (a, b) = 1$ , তেন্তে  
 $a | c$ .

If  $a | bc$  and  $\text{g.c.d. } (a, b) = 1$ , then  
 $a | c$ .

5. (a) কেতিয়া দুটা বৈধিক সমীকৰণ প্ৰণালী সমতুল্য হ'ব,  
লিখা।

1

Write when two linear systems of  
equations are equivalent.

(b) সত্য নে অসত্য লিখা :

1

Write whether True or False :

এটা বৈধিকভাৱে স্বতন্ত্র ভেক্টৰৰ সংহতিত শূন্য  
ভেক্টৰ থাকিব নোৱাৰে।

A linearly independent set of  
vectors never contains the zero  
vector.

(c) দেখুওৱা যে বৈধিকভাৱে স্বতন্ত্র ভেক্টৰৰ সংহতিৰ অবিকৃ  
উপসংহতি বৈধিকভাৱে স্বতন্ত্র হ'ব।

2

Show that a non-empty subset of a  
linearly independent set is linearly  
independent.

( 7 )

- (d) যদি  $a, b, c$  বৈধিকভাবে স্বতন্ত্র ভেক্টর, তেন্তে দেখুওৱা  
যে  $a+b, b+c, c+a$  বৈধিকভাবে স্বতন্ত্র হ'ব। 3

If the vectors  $a, b, c$  are linearly independent, then show that  $a+b, b+c, c+a$  are linearly independent.

- (e) তলৰ ভেক্টৰ সমীকৰণটো সমাধান কৰা : 5

Solve the following vector equation :

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3 + x_4 v_4 = 0$$

য'ত (where)

$$v_1 = (1, 1, 2, 4), \quad v_2 = (2, -1, -5, 2)$$

$$v_3 = (1, -1, -4, 0), \quad v_4 = (2, 1, 1, 6)$$

( Additional 20 marks for 2023 Batch )

6. (a) দেখুওৱা যে যদি  $\alpha$  আৰু  $\beta$ ,  $x^2 - 2x + 4 = 0$  ব'ৰ দুটা  
মূল হয়, তেন্তে

$$\alpha^n + \beta^n = 2^{n+1} \cos \frac{n\pi}{3}$$

4

Show that if  $\alpha$  and  $\beta$  are the roots of  
 $x^2 - 2x + 4 = 0$ , then

$$\alpha^n + \beta^n = 2^{n+1} \cos \frac{n\pi}{3}$$

- (b) ফলনৰ সর্বোচ্চ আৰু সবনিম্ন থাকিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়  
চৰ্তটো লিখি প্ৰমাণ কৰা। 4

State and prove the necessary condition  
for existence of extremum of a function.

- (c) তলৰ বক্রডালৰ প্রাথমিক অক্ষ সাপেক্ষে হোৱা আৰ্ডনৰ  
ফলত উৎপন্ন হোৱা গোটা বস্তুটোৰ পৃষ্ঠাগৰ কালি  
উলিওৱা : 4

Find the surface area of the solid generated by revolving the following curve about the initial line :

$$r = 2a \cos \theta$$

- (d) যদি (If) g.c.d.  $(a, b) = 1$ , তেন্তে দেখুওৱা যে  
(then show that)

$$\text{g.c.d } (a^n, b^n) = 1; \quad n \geq 1$$
4

- (e) দেখুওৱা যে তলৰ ভেষ্টিকেইটা বৈধিকভাৱে স্বতন্ত্র : 4

Show that the following vectors are linearly independent :

$$(1, 1, 0, 0); \quad (0, 1, -1, 0); \quad (0, 0, 0, 3)$$

★ ★ ★