

Total No. of Printed Pages—8

1 SEM TDC MTH G 1

2 0 1 3

(November)

MATHEMATICS

(General)

Course : 101

[(a) Classical Algebra, (b) Trigonometry,
(c) Vector Calculus]

Full Marks : 80
Pass Marks : 32

Time : 3 hours

The figures in the margin indicate full marks
for the questions

GROUP—A

(Classical Algebra)

1. তলত দিয়া প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ কৰা : $1 \times 3 = 3$

Answer the following questions :

(a) বাস্তৱ অনুক্ৰমৰ সংজ্ঞা দিয়া।

Define real sequence.

(b) অসীম গুণোভৰ শ্ৰেণী

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$$

অভিসাৰিতাৰ চৰ্ত উল্লেখ কৰা।

State the condition for convergence of
infinite geometric series

$$a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$$

- (c) যদি বহুপদ বাণি $p(x)$ ক $x - \alpha$ বে হবণ কৰা হয় (α যি কোনো এটা প্রকরণ), তেন্তে ভাগশেষ উল্লেখ কৰা।

If a polynomial $p(x)$ is divided by $x - \alpha$, where α is a constant, then state the remainder.

2. তলত দিয়া প্রশ্নসমূহ উত্তৰ কৰা : $2 \times 5 = 10$

Answer the following questions :

- (a) প্রমাণ কৰা যে এটা অভিসারী অনুক্রম দুটা পৃথক সীমা নাথাকে।

Prove that a convergent sequence cannot tend to two distinct limits.

- (b) এটা অসীম শ্রেণী অভিসারী হোৱা ডি-এলেমবার্টের অনুপাত পরীক্ষাৰ চৰ্তকেইটা উল্লেখ কৰা।

State the conditions of d'Alembert's ratio test for convergence of a series.

- (c) অভিসারিতা পরীক্ষা কৰা :

Test for convergence of the series :

$$\frac{1}{2.3} - \frac{1}{3.4} + \frac{1}{4.5} - \frac{1}{5.6} + \dots$$

- (d) যদি $1, x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}$ সমীকৰণ $x^n - 1 = 0$ বি n টা মূল, তেন্তে দেখুওৱা যে

$$(1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3) \cdots (1 - x_{n-1}) = n$$

If $1, x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}$ are the roots of the equation $x^n - 1 = 0$, then show that

$$(1 - x_1)(1 - x_2)(1 - x_3) \cdots (1 - x_{n-1}) = n$$

(3)

- (e) দেখুওৱা যে $x^4 - 6x^2 + 6x - 2 = 0$ ব এটা মূল
- 3 আৰু - 2 ব মাজত আছে।

Show that the equation
 $x^4 - 6x^2 + 6x - 2 = 0$ has a root between
- 3 and - 2.

3. (a) দেখুওৱা যে $\{u_n\}$ অভিসাৰি, যদি

$$u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \quad 3$$

Show that the sequence $\{u_n\}$ is
convergent, if

$$u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n}$$

- (b) ক'চিৰ অভিসাৰি সম্পৰ্কীয় সাধাৰণ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি,
দেখুওৱা যে $\{u_n\}$ অনুক্ৰমটো অভিসাৰি নহয়। য'ত

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n} \quad 4$$

Use general principle of Cauchy's
criterion to show that $\{u_n\}$ is not
convergent, where

$$u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n}$$

4. তলৰ যি কোনো দুটোৰ অভিসাৰিতা পৰীক্ষা কৰা : $5 \times 2 = 10$

Test the convergence of any two of the
following :

$$(i) \frac{x}{1} + \frac{1}{2} \frac{x^2}{3} + \frac{1.3}{2.4} \frac{x^3}{5} + \frac{1.3.5}{2.4.6} \frac{x^4}{7} + \dots, x > 0$$

$$(ii) 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3^2} + \frac{x^3}{4^3} + \dots$$

(4)

$$(iii) 1 + \frac{2^p}{|2|} + \frac{3^p}{|3|} + \frac{4^p}{|4|} + \dots \text{ to } \infty, \forall p \in R$$

5. (a) যদি $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ সমীকরণের মূল তিনিটা α, β, γ হয়; তেন্তে

$$\alpha - \frac{1}{\beta\gamma}, \beta - \frac{1}{\gamma\alpha}, \gamma - \frac{1}{\alpha\beta}$$

মূলবিশিষ্ট সমীকরণটো নির্ণয় করা।

5

If α, β, γ be the roots of the equation $x^3 + px^2 + qx + r = 0$, form the equation whose roots are $\alpha - \frac{1}{\beta\gamma}, \beta - \frac{1}{\gamma\alpha}, \gamma - \frac{1}{\alpha\beta}$.

অথবা / Or

প্রমাণ করা যে n -তম ঘাতের বীজগণিতীয় সমীকরণ এটাৰ কেৰল n টা বাস্তৱ অথবা কাঙ্গালিক মূল থাকে।

Prove that every algebraic equation of degree n has exactly n real or imaginary roots.

- (b) কাৰ্ডন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি, $x^3 - 6x - 9 = 0$ সমীকরণটো সমাধান কৰা।

5

Solve the equation $x^3 - 6x - 9 = 0$ using Cardan's method.

GROUP—B

(Trigonometry)

6. (a) $\sin \alpha$ ক া α র ঘাতত বিস্তৃত কৰোতে দ্বিতীয় পদটো কিমান ?

1

What is the 2nd term in the expansion of $\sin \alpha$ in terms of α ?

(5)

(b) গ্রেগ'রির শ্রেণীটো উল্লেখ করা।

1

State Gregory's series.

(c) প্রমাণ করা যে

Prove that

$$\left(\frac{1 + \cos \theta + i \sin \theta}{1 + \cos \theta - i \sin \theta} \right)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

2

7. ডি মইভার উপপাদ্যটো লিখা আৰু যি কোনো অখণ্ড সংখ্যা n বা
বাবে উপপাদ্যটো প্রমাণ কৰা।

5

State De Moivre's theorem and prove it when
 n is any integer.

অথবা / Or

যদি $x = \cos \theta + i \sin \theta$ আৰু $1 + \sqrt{1 - a^2} = na$, প্রমাণ
কৰা যে

$$1 + a \cos \theta = \frac{a}{2n} (1 + nx) \left(1 + \frac{n}{x} \right)$$

If $x = \cos \theta + i \sin \theta$ and $1 + \sqrt{1 - a^2} = na$,
prove that

$$1 + a \cos \theta = \frac{a}{2n} (1 + nx) \left(1 + \frac{n}{x} \right)$$

8. (a) $\log \{\log (\cos \theta + i \sin \theta)\}$ ক $A + iB$ ত প্রকাশ
কৰা।

2

Express $\log \{\log (\cos \theta + i \sin \theta)\}$ in the
form $A + iB$.

(6)

(b) প্রমাণ করা যে / Prove that

$$\tan \left\{ i \log \frac{a - ib}{a + ib} \right\} = \frac{2ab}{a^2 - b^2}$$

য'ত a আৰু b দুটা বাস্তৱ বাণি।

3

where a and b are two real quantities.

(c) প্রমাণ করা যে / Prove that

$$\frac{\pi}{4} = \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{7} \right) - \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3^3} + \frac{1}{7^3} \right) + \frac{1}{5} \left(\frac{2}{3^5} + \frac{1}{7^5} \right) - \dots$$

অথবা / Or

$$\text{যদি } -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, \text{ প্রমাণ করা যে$$

$$\log \sec \theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta - \frac{1}{4} \tan^4 \theta + \frac{1}{6} \tan^6 \theta - \dots$$

If $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, prove that

$$\log \sec \theta = \frac{1}{2} \tan^2 \theta - \frac{1}{4} \tan^4 \theta + \frac{1}{6} \tan^6 \theta - \dots$$

9. (a) যদি $\cos^{-1}(u + iv) = \alpha + i\beta$, প্রমাণ করা যে
 $x^2 - (1 + u^2 + v^2)x + u^2 = 0$ সমীকৰণৰ মূল দুটা
 $\cos^2 \alpha$ আৰু $\cosh^2 \beta$.

3

If $\cos^{-1}(u + iv) = \alpha + i\beta$, prove that $\cos^2 \alpha$
and $\cosh^2 \beta$ are the roots of the equation

$$x^2 - (1 + u^2 + v^2)x + u^2 = 0$$

(7)

(b) যোগফল নির্ণয় করা :

5

Find the sum :

$$\cos \theta - \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{3} \cos 3\theta - \dots \text{ to } \infty, -\pi < \theta < \pi$$

অথবা / Or

Sine শ্রেণীর n কোণের যোগফল নির্ণয় করা, যেতিয়া কোণবোৰ সমান্তর প্ৰগতিত থাকে।

Find the sum of the sines of a series of n angles which are in arithmetical progression.

GROUP—C

(Vector Calculus)

10. (a) তলত দিয়া বাশিটো শুন্দৰকৈ লিখা :

Write the following expression correctly :

$$\frac{d}{dt} (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{A} \times \frac{d\vec{B}}{dt} + \vec{B} \times \frac{d\vec{A}}{dt}$$

1

(b) ভেট্টৰ অৱকল অপারেটৰ ∇ বৰ সংজ্ঞা দিয়া।

1

Give the definition of vector differential operator ∇ .(c) যদি $r = |\vec{r}|$, য'ত $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, প্ৰমাণ কৰা যে

$$\nabla r^n = nr^{n-2}\vec{r}$$

2

If $r = |\vec{r}|$, where $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$, prove that

$$\nabla r^n = nr^{n-2}\vec{r}$$

(8)

11. $f(x, y, z)$ ফলনৰ (x, y, z) বিশ্বুত দিশাংকীত অৱকলতা বুলিলে
কি বুজা ? অক্ষৰ দিশত ইয়াৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

3

What do you mean by directional derivative
of $f(x, y, z)$ at the point (x, y, z) ? Find its
values in the direction of coordinate axes.

অথবা / Or

$\phi = x^3 + y^3 + z^3$ ফলনটোৰ $\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ ভেষ্টৰ দিশত
(1, -1, 2) বিশ্বুত দিশাংকীত অৱকলতা নিৰ্ণয় কৰা।

Find the directional derivative of
 $\phi = x^3 + y^3 + z^3$ at the point (1, -1, 2) in the
direction of the vector $\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$.

12. তলৰ যি কোনো দৃষ্টিৰ উত্তৰ কৰা :

4×2=8

Answer any two of the following :

(a) প্ৰমাণ কৰা যে

Prove that

$$\text{curl}(\phi \vec{A}) = (\text{grad } \phi) \times \vec{A} + \phi (\text{curl } \vec{A})$$

(b) যদি $\vec{f} = x^2 z \hat{i} - 2y^3 z^2 \hat{j} + xy^2 z \hat{k}$ ৰ (1, -1, 1)

বিশ্বুত $\nabla \cdot \vec{f}$ আৰু $\nabla \times \vec{f}$ নিৰ্ণয় কৰা।

If $\vec{f} = x^2 z \hat{i} - 2y^3 z^2 \hat{j} + xy^2 z \hat{k}$, determine
 $\nabla \cdot \vec{f}$ and $\nabla \times \vec{f}$ at (1, -1, 1).

(c) প্ৰমাণ কৰা যে

Prove that

$$\nabla \times (\nabla f) = 0$$
